

NAME



BIRTHDAY

年 月 日 生まれ

3 歳までの予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

ワクチン接種が済んだら
完了した日付を入れましょう！

ワクチン名		接種回数	0歳	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月 ～11か月	12か月 ～15か月	16か月 ～17か月	18か月 ～23か月	2歳	3歳
Hib(ヒブ)	皮下注射 定期 不活化	4			1 ／	2 ／	3 ／	1.2.3はそれぞれ27～56日(4～8週)あける					4 ／	3.4は7～13か月あける			
					1 ／	2 ／	3 ／	1.2.3はそれぞれ27日(4週)あける					4 ／	3.4は60日(2か月)以上あけて、標準として1歳～1歳3か月で接種			
B型肝炎	ユニバーサル 定期 不活化 皮下注射	3			1 ／	2 ／	1.2は27日(4週)以上あける			3 ／	1～3は139日(20週)以上あける						
	母子感染予防		1 ／	2 ／	母親がHBs抗原陽性の場合は接種			3 ／									
ロタウイルス	定期 生 経口	1価	2		1 ／	2 ／	1.2は27日(4週)以上あける 2は生後24週0日までに完了する										
		5価	3		1 ／	2 ／	3 ／	1.2.3は27日(4週)以上あける 3は生後32週0日までに完了する									
4種混合(DPT-IPV)	皮下注射 定期 不活化	4				1 ／	2 ／	3 ／	1.2.3はそれぞれ20～56日(3～8週)あける				4 ／				
3種混合(DPT)	皮下注射 定期 不活化	4							3.4は6か月以上あけ、標準的には3終了後、12～18か月の間に接種								
2種混合(DT)	皮下注射 定期 不活化	1														11歳に定期接種→	
ポリオ(IPV)	皮下注射 定期 不活化	4															
BCG	経皮スタンプ 定期 生	1						1 ／									
MR(麻しん風しん混合)	皮下注射 定期 生	2											1 ／			就学前に2回目接種→	
水痘(みずぼうそう)	皮下注射 定期 生	2							1.2は3か月以上、標準的には6～12か月あける			1 ／		2 ／			
おたふくかぜ	皮下注射 任意 生	1											1 ／				
日本脳炎	皮下注射 定期 不活化	4											1.2は6～28日(1～4週)あける 3を4歳、4を9歳に接種				1 ／ 2 ／
インフルエンザ	皮下注射 任意 不活化	1-2/年					毎年10、11月など		1 ／	2 ／	1.2は2～4週あける		1 ／	2 ／		1 ／ 2 ／	1 ／ 2 ／

定期

定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します。(公費、一部負担あり)

任意

任意接種：希望者が各自で受けます。(自己負担、自治体によっては助成金が出るところもあり)

不活化

不活化ワクチン

生

生ワクチン

定期接種の推奨期間

任意接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の接種可能な期間

健康保険での接種可能な期間

MEMO

NAME



BIRTHDAY

年 月 日 生まれ

4歳からの予防接種マイスケジュール

(標準的接種年齢と接種期間)

ワクチン接種が済んだら
完了した日付を入れましょう！



BEBE MALL

OFFICIAL ONLINE STORE

ワクチン名			接種回数	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳～
Hib(ヒブ)	皮下注射	定期 不活化	4															
肺炎球菌	皮下注射	定期 不活化	4															
B型肝炎	ユニバーサル	定期 不活化	3															
	母子感染予防	皮下注射																
ロタウイルス	1価	定期 生 経口	2															
	5価		3															
4種混合(DPT-IPV)	皮下注射	定期 不活化	4	7.5歳まで														
3種混合(DPT)	皮下注射	定期 不活化	4	7.5歳まで		追加接種を推奨 (任意接種)												2種混合ワクチンの代わりに3種混合ワクチンを接種してもよい(任意接種)
2種混合(DT)	皮下注射	定期 不活化	1									1						標準的には11歳に接種
ポリオ(IPV)	皮下注射	定期 不活化	4	7.5歳まで		追加接種を推奨 (任意接種)												
BCG	経皮スタンプ	定期 生	1															
MR(麻しん風しん混合)	皮下注射	定期 生	2		就学前1年間		2											
水痘(みずぼうそう)	皮下注射	定期 生	2															
おたふくかぜ	皮下注射	任意 生	1															
日本脳炎	皮下注射	定期 不活化	4	1 2	3	1.2は6～28日(1～4週)あけて 3歳で接種 3は1から1年あけて4歳で接種				4							1995年4月2日～2007年4月1日生まれの方は 20歳未満まで定期接種の対象	
インフルエンザ	皮下注射	任意 不活化	1-2 /年	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1 2	1			毎年10、11月などに接種、1.2は2～4週あける 13歳以上は年1回接種	
ヒトパピローマウイルス	2価	定期 不活化	3										1 2 3				1.2は1か月、1～3は6か月あけて接種	
	4価	筋注	3							中学1年生の間に3回接種(女子のみ)			1 2 3				1.2は2か月、1～3は6か月あけて接種	

定期

定期接種：法律に基づいて市町村が主体となって実施します。(公費、一部負担あり)

任意

任意接種：希望者が各自で受けます。(自己負担、自治体によっては助成金が出るところもあり)

不活化

不活化ワクチン

生

生ワクチン

定期接種の推奨期間

定期接種の接種可能な期間

任意接種の推奨期間

任意接種の接種可能な期間